



STOPAIDS
BØSSERNES HIV-ORGANISATION

HIV-TEST

SEX MELLEM MÆND

HIV-TEST

1. del: Hiv-test – kort og godt

Hiv-test – hvad er det?	4
Hvor får man en hiv-test?	4
Hiv-testen er gratis	4
Hvor lang tid skal man vente på svaret?	5
Der er fordele og ulemper ved at blive hiv-testet	5
Grunde til at lade sig hiv-teste	6
Grunde til ikke at tage en hiv-test	7
STOP AIDS' anbefaling	7
Du bestemmer selv	7
Du kan vælge at være anonym	8
Hvornår gælder test-resultatet?	8
Hvad hvis testen er positiv?	9
Hvad hvis testen er negativ?	10
En hiv-test erstatter ikke sikker sex	11

2. del: Hiv-test – mere om bestemte emner

Den traditionelle hiv-test	12
Kviktesten	12
Hjemmetest	13
Forsikringer	14
Hiv-medicin	16
Lovgivning	16
Tavshedspligt, registrering og anonymitet	17

3. del: Adresser og telefonnumre

CheckPoint-klinikken	18
Klinikker for seksygdomme	19
Hospitalsafdelinger specialiseret i hiv og aids	20
Rådgivning	23

I denne pjece kan du læse om muligheden for at blive testet for hiv.

Hiv er et virus, som nedbryder kroppens immunforsvar, så man mister modstandskraften mod sygdomme. Det gør hiv til en livstruende sygdom, der kan føre til aids og i sidste ende til døden. Ved hjælp af hiv-medicin kan man i de fleste tilfælde undgå eller udskyde denne udvikling, men man kan ikke blive helbredt. Hiv vil altid forblive i kroppen.

I Danmark er omkring 1 ud af 20 bøsser og andre mænd, der har sex med mænd, smittet med hiv. Gruppen er dermed den hårdest ramte her i landet.

Ved at følge sikker sex-rådene kan du nedsætte risikoen for at blive smittet med hiv eller at smitte andre.

Sikker sex-rådene er:

Brug kondom og glidecreme, når du boller, og undgå sæd i munden. Glidecremen skal være vandbaseret eller silikonebaseret.

Pjecen er opdelt i tre dele:

- I første del kan du læse – kort og godt – om hiv-testen og dens fordele og ulemper.
- I anden del af pjecen kan du læse mere om en række emner, som kan være relevante for dig, når du skal beslutte, om du vil hiv-testes eller ej.
- I tredje del af pjecen finder du en oversigt over, hvor du kan få personlig rådgivning, og hvor du kan blive testet for hiv.

Denne pjece er skrevet til bøsser og andre mænd, der har sex med mænd. Pjecen er udsendt af STOP AIDS – Bøssernes hiv-organisation.



Hiv-test – hvad er det?

Hiv-testen er et tilbud til dig, der ønsker at vide, om du er smittet med hiv.

Undersøgelsen foregår ved hjælp af en blodprøve. Hvis testen viser positiv, er du smittet med hiv. Hvis testen viser negativ, betyder det i de fleste tilfælde, at du ikke er smittet med hiv.

Hvor får man en hiv-test?

Du kan få taget hiv-testen:

- på CheckPoint-klinikken
- på en klinik for seks sygdomme eller kønssygdomme
- på en hospitalsafdeling, der er specialiseret i hiv og aids
- på visse andre hospitaler og sygehuse
- hos din egen praktiserende læge
- hos en anden praktiserende læge
- hos en speciallæge for hud- og kønssygdomme

Hiv-test købt over internettet eller på apoteket kan ikke anbefales. Læs mere om ulemperne ved hjemmetest på side 13.

Hiv-testen er gratis

Hiv-testen er gratis, hvis du tager testen på CheckPoint-klinikken, på en klinik for seks sygdomme eller på en hospitalsafdeling med speciale i hiv og aids.

Hiv-testen er også gratis hos din egen praktiserende læge. Derimod skal du som regel betale for hiv-testen, hvis du får den taget hos en anden praktiserende læge end din egen.

Hvor lang tid skal man vente på svaret?

Normalt går der 3-7 dage, fra du får taget blodprøven, til du får svar. Ventetiden skyldes, at blodprøven skal sendes til laboratorium, og at man i nogle tilfælde tager flere test på den samme blodprøve for at opnå den størst mulige sikkerhed i svarresultatet.

Det kan være meget ubehageligt at vente på svaret på en hiv-test. I ventetiden kan du eventuelt benytte dig af de forskellige tilbud om rådgivning, der findes. Du kan få anonym telefonrådgivning eller få en personlig aftale hos en professionel rådgiver. Du finder en liste over forskellige rådgivningstilbud på side 23.

På CheckPoint-klinikken kan du få en såkaldt kviktest, hvor du får svaret inden for en time. Samtidig får du tilbudt coaching af en professionel rådgiver, der har erfaring med at rådgive om sex, bøsse og hiv. Du finder flere oplysninger om kviktesten og CheckPoint på side 12 og 18 samt på stopaids.dk.

Der er fordele og ulemper ved at blive hiv-testet

Der er både fordele og ulemper ved at blive testet for hiv. Noget af det, du kan bruge som grundlag for din beslutning, er:

- om du har været udsat for en smitterisiko
- om du føler dig syg
- om du mener, at du vil have gavn af at kende testsvaret

Det er helt op til dig selv at overveje fordele og ulemper. På de næste sider finder du en oversigt over mulige fordele og ulemper ved at lade dig teste for hiv. Måske kan det hjælpe dig i dine overvejelser.

Grunde til at lade sig hiv-teste

· hvis det viser sig, at du er hiv-negativ:

Du kan slippe for unødige bekymringer

Hvis testen viser hiv-negativ, slipper du for at bekymre dig over, om du er hiv-smittet eller ej.

· hvis det viser sig, at du er hiv-positiv:

Du kan få bedre lægehjælp

Lægerne kan bedre hjælpe dig, når du er testet hiv-positiv. Gennem blodprøver kan du få målt dit immunforsvar og din virusmængde, og du kan få adgang til hiv-medicin, når det er optimalt for dig.

Farligt at vente til sidste øjeblik

Det er risikabelt at vente for lang tid med at blive testet. Er du smittet med hiv, og bliver det først opdaget, når dit immunforsvar er alvorligt nedbrudt, kan konsekvenserne være alvorlige for dig: Nogle hiv-positive dør, fordi de kommer for sent i gang med at tage hiv-medicin. Andre overlever, men udvikler ubehagelige følger, som aldrig forsvinder, selv om hiv-medicinen ellers får forbedret immunforsvaret.

Mindre risiko for sygdom og død

Begynder du med at tage hiv-medicin, mens dit immunforsvar stadig er velfungerende, har du bedre leveudsigter. Du har mindre risiko for at blive syg, og du har mindre risiko for at dø som følge af hiv.

· hvis du og din kæreste overvejer at droppe kondomet:

Vær sikker på hinanden, før I dropper kondomet

Hvis du og din kæreste overvejer at droppe kondomet i jeres parforhold, så er det vigtigt, at I er sikre på, at I har samme hiv-status. Selv om I begge tror, at I er hiv-negative, er det nødvendigt, at I begge tager en hiv-test, før I dropper kondomet. Derudover er det også vigtigt, at I taler ærligt om, hvad I gør, hvis en af jer eller I begge har et sidespring.

Grunde til ikke at tage en hiv-test

· Er testen nødvendig?

Der er ingen grund til at blive hiv-testet, hvis du ikke har været udsat for en smitterisiko.

· Er du parat til en ubehagelig besked?

Mange hiv-positive oplever det som en psykisk belastning at leve med visheden om at være smittet med hiv. Overvej, om du er klar til at få denne besked.

· Problemer med forsikringer

Hvis du er testet hiv-positiv, vil det give dig problemer med at tegne en række forskellige forsikringer. Læs mere på side 14.

· Fordomme og diskrimination

Mange hiv-positive oplever stadig – selv i bøsse miljøet – at blive udsat for fordomme og diskrimination.

STOP AIDS' anbefaling

Mange bøsser, der tester hiv-positive, har en alvorlig svækkelse af immunforsvaret. Ofte har de ventet meget længe med at tage hiv-testen. Derfor har de nu større risiko for at blive syg og større risiko for at dø tidligt.

Hvis du er hiv-positiv, er det vigtigt at begynde på hiv-medicin, før dit immunforsvar bliver alvorligt svækket. Hvis du begynder i rette tid, kan du normalt forvente at leve næsten lige så længe som alle andre.

Derfor anbefaler STOP AIDS, at du tester dig i tide, hvis du har været udsat for hiv-smitte.

Du bestemmer selv

Husk, at det er dig selv, der skal afgøre, om du vil testes for hiv. Du behøver ikke lade dig presse til en hiv-test, som du ikke selv ønsker.

Du kan vælge at være anonym

Du kan vælge at blive testet anonymt, hvis du foretrækker det. Hvis du vil testes anonymt, skal du gøre opmærksom på dette, inden du får taget blodprøven. Overvej, om du kan være sikker på anonymiteten, hvis du bliver testet hos din egen læge eller hos en læge i dit lokalområde.

Måske føler du dig mere tryk ved at få taget hiv-testen uden for dine vante omgivelser. Du kan vælge at tage hiv-testen på CheckPoint-klinikken, på en af klinikkerne for seks sygdomme eller på en af hospitalsafdelingerne, der er specialiseret i hiv og aids.

Hvornår gælder test-resultatet?

Der kan gå op til tre måneder, fra man har været udsat for hiv-smitte, til smitten kan måles i blodet. I langt de fleste tilfælde – omkring 95 procent – vil smitten dog vise sig i blodet allerede en måned efter smittetidspunktet.

Hvad hvis testen er positiv?

Det kan være meget ubehageligt at få besked om, at man er smittet med hiv. Hiv kan ikke helbredes, og det kan være vanskeligt at acceptere visheden om, at man er hiv-smittet for resten af livet.

Viser din hiv-test, at du er smittet med hiv, vil du ofte blive tilbudt professionel rådgivning. Du kan få professionel rådgivning med det samme, hvis du har valgt at lade dig hiv-teste på CheckPoint-klinikken, en klinik for seks sygdomme eller på et hospitalsafdeling med speciale i hiv og aids.

Selv om hiv ikke kan fjernes fra kroppen, kan sygdommen normalt holdes nede eller udskydes med hiv-medicin. Læs mere om forskellige fordele og ulemper ved hiv-medicin på side 16.

Hiv-medicin virker effektivt på mange hiv-positive, men den virker ikke lige godt på alle. De bedste leveudsigter har hiv-positive, som går i gang med medicinen, inden immunforsvaret er svækket.

Det er den bedste grund til at blive hiv-testet. Viser det sig, at du er hiv-positiv, vil du blive tilbudt at få målt dit immunforsvar og din virusmængde hver 3.-6. måned. Disse målinger bruger du sammen med din hospitalslæge til at finde det bedst mulige tidspunkt at begynde at tage hiv-medicin.



Hvad hvis testen er negativ?

Hvis hiv-testen viser negativ, kan du som udgangspunkt godt regne med, at du ikke er smittet med hiv. Men som allerede nævnt kan der gå op til tre måneder, fra man har været udsat for smitte, til smitten kan måles i blodet. I omkring 95 procent af tilfældene vil smitten dog vise sig i blodet allerede inden for en måned efter smittetidspunktet.

Selv om testen viser hiv-negativ, kan du altså alligevel være smittet med hiv. I så fald er du blevet smittet i løbet af de seneste tre måneder, før du fik taget blodprøven.

Hvis ikke du har været udsat for en smitterisiko i de sidste tre måneder inden hiv-testen, kan du regne med testens svarresultat.

En negativ hiv-test er selvfølgelig en god nyhed. Men det er samtidig en god anledning til at tænke over, hvordan du fremover vil håndtere dit sexliv, så du undgår at blive hiv-smittet. Ved at følge sikker sex-rådene kan du med meget stor sikkerhed undgå at blive smittet med hiv.

Sikker sex-rådene er:

Brug kondom og glidecreme, når du boller, og undgå sæd i munden. Glidecremen skal være vandbaseret eller silikonebaseret.

En hiv-test erstatter ikke sikker sex

Nogle mænd bruger hiv-testen som en slags erstatning for sikker sex. De lader sig teste med jævne mellemrum, og når testen flere gange har vist negativ, føler de sig selvfølgelig lettede, men måske føler de sig også mindre i risiko for at få hiv.

Hiv smitter ikke hver gang, og du kan derfor opleve, at hiv-testen fortsat er negativ, selv om du har bollet uden kondom. Problemet er, at man ikke kan vide, hvornår hiv smitter: Du kan have usikker sex mange gange, inden hiv smitter dig. Men du kan også blive smittet allerede den første gang, du boller uden kondom.

Det er derfor en meget dårlig idé at lade hiv-testen erstatte sikker sex. Du risikerer, at en dag er hiv-testen positiv, og så er du hiv-smittet for resten af livet.

Den traditionelle hiv-test

I Danmark foregår en hiv-test normalt på følgende måde: Du får taget en blodprøve af en læge eller en sygeplejerske, hvorefter I aftaler en tid, hvor du kan komme og få svar på din test. Lægen må ikke give dig svarresultatet over telefonen – du er nødt til at møde op for at få svaret. Reglerne er lavet sådan, fordi det kan have alvorlige psykiske konsekvenser at få svaret, hvis hiv-testen viser, at du er smittet med hiv.

Der går en uge, fra du får taget blodprøven, til du kan få svar. På Bispebjerg Hospital i København kan du dog få svar allerede efter tre arbejdsdage. Når du ikke kan få svar med det samme, skyldes det, at din blodprøve skal undersøges i et laboratorium. Først bliver blodprøven udsat for en test for antistoffer og ved de fleste test også for antigener.

Hvis testen viser negativ, er det svaret på din hiv-test. Du kan dermed regne med, at du ikke er smittet med hiv. Husk dog, at du godt kan være smittet inden for de seneste tre måneder forud for testtidspunktet, hvis du i den periode har været udsat for en smitterisiko.

Hvis testen viser positiv, betyder det i langt de fleste tilfælde, at du er smittet med hiv. Der kan dog være en lille chance for, at testen er falsk positiv, og derfor udsætter man den samme blodprøve for en anden slags test, der er dyrere og måler med endnu større nøjagtighed. Formålet med at bruge de to forskellige test er at sikre dig den størst mulige nøjagtighed. Begge test bliver udført på laboratoriet i dagene, hvor du venter på svar, så det endelige svarresultat er klar til dig, når du møder op for at få dit svar.

Kviktesten

Kviktesten foregår ved, at du får taget en lille blodprøve fra en af dine fingre. Det er hurtigt overstået og helt smertefrit. Kviktesten giver svar inden for 20 minutter.

Kviktesten er ikke en del af de normale testtilbud, men på nogle hospitaler og hos nogle læger kan du under særlige omstændigheder få taget en kviktest i stedet for den traditionelle hiv-test. På CheckPoint-klinikken gives kviktesten sammen med professionel rådgivning, og samlet er der sat en time af til dig. Læs mere om CheckPoint på side 18.

Hvis kviktesten viser positiv, betyder det i langt de fleste tilfælde, at du er smittet med hiv. Der kan dog være en lille chance for, at testen er falsk positiv, og du får derfor taget en blodprøve, som bliver sendt ind til laboratorietest for at bekræfte prøvens resultat. Formålet med at bruge de to forskellige test er at sikre dig den størst mulige nøjagtighed.

Hvis testen viser negativ, kan du godt regne med, at du er hiv-negativ, undtagen hvis du har været udsat for en smitterisiko inden for de seneste tre måneder forud for testtidspunktet.

Hjemmetest

På internettet og på nogle apoteker kan du købe hiv-test til hjemmebrug.

STOP AIDS fraråder, at du benytter dig af disse test. Dels risikerer du at blive testet falsk positiv, dels kan det have alvorlige psykiske konsekvenser, hvis testen viser sig at være positiv.

Hvis hiv-testen rent faktisk er positiv, vil du ofte have behov for at tale konsekvenserne igennem med for eksempel en læge, en sygeplejerske eller en professionel rådgiver. Med en hjemmetest er du i stedet overladt til dig selv eller måske nogle venner, som ikke er klædt på til at tackle opgaven. Du risikerer at blive kastet ud i en krise, som for nogles vedkommende kan medføre angst, depression og selvmordstanker.

På grund af usikkerheden ved hjemmetest og de mulige psykiske konsekvenser er det bedre at benytte muligheden for at blive testet gratis på et af de officielle teststeder. Du finder en oversigt over teststeder på side 19-21.

Forsikringer

Hvis du er testet hiv-positiv, vil du ofte få sværere ved at tegne en række private forsikringer. Det skyldes, at forsikrings-selskaberne vurderer, at du har større risiko for at blive syg eller for at dø en tidlig død.

Dette gælder for eksempel livsforsikringer, ulykkesforsikringer, pensionsordninger, sygeforsikringer og rejseforsikringer. Reglerne varierer meget fra selskab til selskab og ændrer sig løbende.

Generelt er det sådan, at hvis du er konstateret hiv-positiv, kan du ikke tegne livsforsikringer. Du kan også have besvær med at tegne en ulykkesforsikring, en pensionsordning eller en rejseforsikring. Du vil ofte blive optaget på skærpede vilkår, der kan betyde begrænsninger i dækningen, og at forsikringen er dyrere for dig.

Ønsker du at tegne en af de nævnte forsikringer, skal du i mange tilfælde oplyse om dine helbredsforhold, på tro og love. Det betyder, at du skal oplyse, hvis du er konstateret hiv-positiv. Når du tegner forsikringen, sikrer forsikringsselskabet sig som regel rutinemæssigt din tilladelse til at indhente lægelige oplysninger, hvis selskabet skønner et behov for det.

Forsikringsselskabet kan godt vente med at indhente oplysninger om dig til den dag, hvor de står foran at skulle udbetale penge til dig. Det kan være lang tid efter, at du har tegnet forsikringen, og hvor du måske har nået at indbetale mange penge til forsikringen. Det er derfor en dårlig idé at give forkerte oplysninger om din hiv-status, når du tegner en forsikring. Ud over at det er strafbart, risikerer du, at du eller dine efterladte alligevel ikke kan få udbetalt erstatninger fra forsikringsselskabet.

Hvis du allerede har tegnet en forsikring, vil den – med undtagelse af visse rejseforsikringer – normalt fortsat gælde, hvis du på et senere tidspunkt bliver testet hiv-positiv. Her behøver du altså ikke oplyse til forsikringsselskabet, at du er blevet konstateret hiv-positiv.

Fordi du, når du først er testet hiv-positiv, har svært ved at tegne de nævnte forsikringer, kan det være en god idé at tænke over, om du har brug for nogle af de forsikringer, før du får taget en hiv-test.



Hvis du vil have yderligere oplysninger, må du forhøre dig om reglerne hos det forsikringsselskab, du er interesseret i. Du kan også henvende dig til Forsikringsoplysningen eller til Hiv-Danmarks rådgivning for hiv-positive.

Hiv-medicin

Hiv-medicin undertrykker det hiv-virus, som er i alle hiv-positive blod. På den måde kan medicinen forhindre eller udskyde, at du bliver syg eller dør af aids.

Desværre har en del hiv-positive ubehagelige bivirkninger af hiv-medicinen, men ofte forsvinder mange af bivirkningerne efter en indkøringsfase på en måneds tid. Er bivirkningerne alvorlige, kan du sammen med din læge skifte til en af de andre typer af hiv-medicin, som findes på markedet.

Ikke alle hiv-positive tager hiv-medicin. Når du er konstateret hiv-positiv, vil du blive tilbudt at få målt dit immunforsvar og din virusmængde på et af de hospitaler, der er specialiseret i hiv og aids. Afhængig af disse målinger vil du sammen med en læge afgøre, om det er nødvendigt at komme i behandling med det samme, eller om behandlingen kan vente. For mange hiv-positive er det først nødvendigt at tage hiv-medicin efter adskillige år som hiv-positiv. Andre hiv-positive er nødt til at gå i gang med medicinen kort tid efter, at de er testet hiv-positiv, fordi deres immunforsvar allerede er svækket.

Lovgivning

Nogle lande har restriktioner, der skal forhindre hiv-positive i at rejse på ferie eller i at bosætte sig i det pågældende land. Dette gælder blandt andet USA.

I EU og i de fleste andre europæiske lande er der ingen restriktioner for hiv-positive turister. Nogle europæiske lande har dog opstillet begrænsninger for hiv-positive, der vil bosætte sig i landet.

Danmark har ingen restriktioner for hiv-positive turister, som vil rejse ind eller ud af landet. Til gengæld stiller den danske straffelov særlige krav til hiv-positive, når det gælder sex.

Straffelovens paragraf 252 betyder således, at hiv-positive kan blive straffet for et enkelt samleje uden kondom. Det kræver dog, at den hiv-positive ikke i forvejen har fortalt sin sexpartner, at han er hiv-smittet.

Det er langt fra alle hiv-positive, som selv er klar over, at de er smittet med hiv. Det er typisk fordi, de ikke er blevet hiv-testet gennem et stykke tid, eller fordi de er blevet smittet for nylig.



Selv om man ikke er konstateret hiv-positiv, kan man i princippet blive straffet for usikker sex, hvis det viser sig, at man er hiv-positiv. Det kræver dog, at man har haft meget god grund til at tro, at man er smittet med hiv.

For hiv-negative stiller straffeloven ingen krav om, at man skal sørge for at beskytte sig selv. Men det er en ringe trøst at kunne henvise til straffeloven, efter at man er blevet smittet med hiv, fordi man overlod hele ansvaret for sikker sex til sin sexpartner.

Tavshedspligt, registrering og anonymitet

Læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale har tavshedspligt. De må ikke videregive oplysninger, med mindre du selv har givet dem tilladelse. Du må dog acceptere, at oplysninger om din hiv-status bliver nedskrevet i din journal, og at oplysningerne derfor kan cirkulere mellem personalet på det enkelte hospital eller lægeklinik.

Hvis du bliver testet hiv-positiv, gemmer myndighederne oplysninger om din hiv-status. Oplysningerne bruges blandt andet til statistik over, hvor mange der smittes med hiv, og hvilke grupper der er hårdest ramt af sygdommen.

Der er meget strenge regler for opbevaringen og behandlingen af disse oplysninger. Alligevel kan det være, at du er bekymret for misbrug, hvis det skulle vise sig, at din hiv-test er positiv. Hvis du er bekymret, kan du altid kræve at få taget din hiv-test anonymt. På side 8 kan du læse, hvordan du bliver testet anonymt.

Checkpoint-klinikken

Checkpoint-klinikken er et midlertidigt projekt, der foreløbig kører i dele af 2008. CheckPoint er et rådgivnings- og testprojekt, som STOP AIDS driver, og hvor personalet er rådgivere fra Sikker6.info og Hiv-Danmark. Rådgiverne har mange års erfaring med rådgivning om sikker sex og mænd, der har sex med mænd. Det er Københavns Kommune, som står bag projektet og støtter det økonomisk.

Klinikken ligger i det centrale København. Den tilbyder kviktest, hvor du inden for en time får både svar på hiv-testen, professionel rådgivning og tilbud om sikker sex-coaching. Du kan læse mere om kviktesten på side 12.

CheckPoints åbningstider er begrænsede og kan variere. Du kan finde opdaterede oplysninger om CheckPoint på stopaids.dk.

Klinikker for seksyldomme

Københavns Venereaklinik

Bispebjerg Hospital

Bispebjerg Bakke 23, Indgang 4, 3. tværvæg, afdeling D, 1. sal
2400 København NV

Telefon: 35 31 31 88 (rådgivningen)

Åben konsultation: Mandag-torsdag 8.30-17.30,
samt fredag 8.30-14.00.

Amtssygehuset i Gentofte

Dermato-venerologisk afdeling – afdelingen for kønssygdomme

Niels Andersens Vej 65, 2900 Hellerup

Telefon: 39 77 31 88

Åben konsultation: Alle hverdage 9-12,
samt tirsdag og torsdag 16-17.

Dermato-Venerologisk Afdeling D

Århus Sygehus

P. P. Ørumsgade 11, 8000 Århus C

Telefon 89 49 18 61

Åben konsultation: Mandag, onsdag, torsdag
og fredag 8.00-8.30, samt tirsdag 15.00-16.30.

Odense Universitetshospital

Dermatologisk-Venerologisk Afdeling

Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C

Telefon: 65 41 27 07

Åben konsultation: Tirsdag og torsdag 16-17.

Sexualvejledningsklinikken

Jyllandsgade 79 C, 6700 Esbjerg

Telefon: 76 11 94 40

Åben konsultation: Onsdag 16-18.



Hospitalsafdelinger specialiseret i hiv og aids

Rigshospitalet

Epidemiafdelingen, ambulatoriet
Afsnit 5112, opgang 51 C, 1. sal
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
Telefon: 35 45 51 12
Hiv-test tilbydes: Mandag-torsdag 8.15-14.30,
samt fredag 8.15-13.30.

Hvidovre Hospital

Infektionsmedicinsk ambulatorium
Afsnit 144
Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre
Telefon: 36 32 30 16
Hiv-test tilbydes: Mandag-fredag 9-14.

Skejby Sygehus

Infektionsmedicinsk afdeling Q
Brendstrupgårdsvej, 8200 Århus N
Telefon: 89 49 83 51
Hiv-test tilbydes: Mandag-fredag 9-12.

Odense Universitetshospital

C-ambulatoriet
Klostervænget 2, bygning 15, 5000 Odense C
Telefon: 65 41 26 47
Hiv-test tilbydes: Mandag-fredag 8-13.30.

Aalborg Sygehus Syd

Infektionsmedicinsk ambulatorium B3
Hobrovej 18-22, 9000 Aalborg
Telefon: 99 32 23 53
Hiv-test tilbydes: Mandag-fredag 7.30-15.30.

Kolding Sygehus

Infektionsmedicinsk ambulatorium A3
Skovvangen 2-8
6000 Kolding
Telefon: 76 36 21 60
Hiv-test tilbydes: Mandag-fredag 8.00-14.30

Helsingør Hospital

Infektionsmedicinsk ambulatorium, Pl. 3
Esrumvej 145
3000 Helsingør
Telefon: 48 29 67 62
Hiv-test tilbydes: Mandag, tirsdag og torsdag 8-14,
samt onsdag 12-18

Regionshospitalet Herning

Medicinsk ambulatorium
Gl. Landevej 61
7400 Herning
Telefon: 99 27 20 00
Hiv-test tilbydes: Mandag-fredag 7.30-13.30

Rådgivning

Rådgivning og information om hiv og andre seks sygdomme:

Sikker6.info:

telefon 33 91 11 19

sikker6.info

Rådgivning til hiv-positive og pårørende:

Rådgivning Øst (med lokaler i København):

telefon 33 32 58 60

Rådgivning Vest (med lokaler i Jylland og på Fyn):

telefon 70 22 58 68

hiv-danmark.dk

TEKST: THOMAS R. KRISTENSEN
GRAFISK DESIGN: MIKKEL SONNE
TRYK: LITOPRINT

Mere om sex og hiv

Vil du læse mere om sex og hiv, kan du bestille STOP AIDS' øvrige pjecer Hiv og Smitteveje, Analsex, Oralsex, Sexikon, PEP, Beyond Vanilla og Positiv Sex.

Er du interesseret i information om andre sexsygdomme end hiv, kan du bestille pjecen Sexsygdomme.

Du kan også downloade pjecerne på vores hjemmeside stopaids.dk.

Denne pjece er udgivet af:
STOP AIDS – Bøssernes hiv-organisation
Amagertorv 33, 3. sal, Postboks 190
1006 København K
33 11 29 11
stopaids@stopaids.dk
stopaids.dk

STOP AIDS – Bøssernes hiv-organisation – er en selvejende institution, hvis primære formål er at bekæmpe spredningen af hiv blandt bøsser og andre mænd, der har sex med mænd.

STOPAIDS.DK

2. UDGAVE, 2008